

SCORE[®] 250 EC

30145

Sistemični fungicid v obliki koncentrata za emulzijo (EC)**Score 250 EC** vsebuje: difenokonazol – 250 g/L (23,2 % w/w), CAS št.: 119446-68-3; solvent nafta (nafta), težka aromatska (60-70 % w/w), CAS št.: 64742-94-5.**Nevarno**

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Positve zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izvajati bruhanja. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Prestrci razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtoknih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretirane varnostne pasove, kot so navedeni v navodilu za uporabo sredstva.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03 v sodelovanju z **Unichem d.o.o.**, Sinja Gorica 2, Vrhnika, tel.: +386 1 75 58 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si

Vsečina: 10 ml

Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, v zravnem prostoru, zaščiten pred soncem in vlago, pri temperaturah med 0 in +35 °C, zaklenjeno, nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in domačim živalim. Sredstva ne hranite v istem prostoru skupaj s hrano, pijačo in krmili.

NAČIN DELOVANJA

Score 250 EC je sistemični fungicid, ki pripada skupini inhibitorjev biosinteze ergosterola, gradnika celičnih membran in podskupini DMI. Sredstvo uporabljamo preventivno, le izjemoma tudi v kurativne namene.

UPORABA**1. GLAVNE UPORABE**

Sredstvo **Score 250 EC** se uporablja:

- na **jablanih** za zatiranje **jablanovejve škrlupa (*Venturia inaequalis*)** v odmerku 2 ml na 100 m² na 6-7,5 L vode. Tretirajte od razvojne faze, ko so odprti prvi cvetovi, do začetka zorenja (BBCH 60-84), največ 3-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 10-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- na **hruškah** za zatiranje **hruščevega škrlupa (*Venturia pyrina*)** v odmerku 2 ml na 100 m² na 6-7,5 L vode. Tretirajte od razvojne faze, ko so odprti prvi cvetovi, do začetka zorenja (BBCH 60-84), največ 3-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 10-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- na **mareličih, breskavih in nektarinarjih** za zatiranje **navadne sadne gnoble (*Monilia* spp.)** in **pepelovke (*Sphaerotheca* spp.)** v 0,03 % koncentraciji in porabi vode 10 do 15 l na 100 m², pri čemer najvišji odmerak enega tretiranja ne sme preseči 4,5 ml na 100 m². Tretirajte od razvojne faze, ko so odprti prvi cvetovi (BBCH 60), zadnje tretiranje se opravi v skladu s predpisano karenco. Dovoljeni sta največ 2 tretirani v eni rastni sezoni, z najmanj 7-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- na **oljakah** za zatiranje **oljkove kozovosti (*Cycloconium oleaginum*)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 8 L vode. Tretirajte od razvojne faze, ko je velikost plodu približno 50 % končne velikosti (košičice prične lignificirati, pokaže se odpornost na urez), do razvojne faze povečevanja značilnega obarvanja (BBCH 75-85), ali po obratni v jesensko – zimskem obdobju. Tretira se lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- na **trti** za **pridelavo vinskega in namiznega grozdja** za zatiranje **odjida vinske trte (*Uncinula necator*)** in **črne grozdnice gnoble (*Guignardia bidwellii*)** v odmerku 2 ml na 100 m² na 8-10 L vode. Tretirajte od razvojne faze, ko je tretji list razvit, do faze mehčanja jagod (BBCH 13-85), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 10-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- v **krompirju** za zatiranje **črne listne pegavosti (*Alternaria solani*)** v odmerku 6 ml na 100 m² na 4-8 L vode. Tretirajte od razvojne faze nastavljanja gomoljev (debelitev na vrhu prvega stolona, do dvakratne srčne premera stolona), do razvojne faze, ko so jagode prve polpodne oker do rjavkasto obarvane (BBCH 40-85), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 7-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- v **oljni ogrščici** za zatiranje **suhе trohnohe zelja (*Phoma lingam*)**, **črne listne pegavosti kapsunic (*Alternaria brassicae*)** in bolezni, ki jih povzročajo **glive iz rodu *Pirenopeziza* (*Pirenopeziza* spp.)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 2-5 L vode. Ozmimo oljno ogrščico prvič tretirajte jeseni od razvitega četrtega lista dalje, drugič pa v spomladanskem času v razvojnih fazah od začetka razvoja stranskih pogankov do konca cvetenja (BBCH 21 do 69). Dovoljeni sta 2 tretirani v eni rastni dobi. Jaro ogrščico tretirajte v spomladanskem času od začetka razvoja stranskih pogankov do konca cvetenja (BBCH 21 do 69). Dovoljeni sta 2 tretirani v eni rastni dobi;
- v **sladkorni krmni in rdeči pesi** za zatiranje **pesne listne pegavosti (*Cercospora beticola*)**, **pesne pepelovke (*Zytripea betae*)** in **pesne rje (*Uromyces betae*)** v odmerku 4 ml na 100 m² na 1-5 L vode. Tretirajte od razvojne faze začetek olistanja; listi pokrijejo 10 % površine tal (BBCH 31), do 28 dni pred pobiranjem, največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 21-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- na **zelju, brokoliju, cvetaki, brstičnem ohrovtu, ohrovtu in kitajskem zelju** za zatiranje **črne listne pegavosti kapsunic (*Alternaria brassicae*)**, **črnope kapsunic (*Alternaria brassicicola*)** in bolezni, ki jih povzročajo **glive iz rodu *Mycosphaerella* (*Mycosphaerella* spp.)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 4-6 L vode.

Tretirajte v času razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 41-49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjem;

- na **bunčnicah za užitno in neužitno lupino** za zatiranje **kumarove pepelovke (*Erysiphe cichoracearum*)**, **bučne in kumarne pepelovke (*Sphaerotheca fuliginea*)** ter bolezni, ki jih povzročajo **glive iz rodov *Alternaria* (*Alternaria* spp.)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 4-8 L vode. Tretirajte od začetka cvetenja, do razvojne faze, ko ima 70 % plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 60-87), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 8-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- na **paradižniku** za zatiranje **črne listne pegavosti paradižnika (*Alternaria solani*)**, **rjave zametne pegavosti paradižnika (*Cladosporium fulvum*)** in **paradižnikove pepelovke (*Leveillula taurica*)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 5-12 L vode. Tretirajte od razvojne faze, začetek rasti stranskih pogankov, do razvojne faze, ko 70 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti (BBCH 20-87), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 7-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- v **gomolji in stebelni zeleni** za zatiranje **listne pegavosti zelene (*Septoria apicola*)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 3-8 L vode. Tretirajte od razvojne faze, ko je doseženih 40 % pričakovane listne mase oz. premera gomolja, do razvojne faze, ko je doseženih 80 % pričakovane listne mase oz. premera gomolja, (BBCH 44-48), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- v **solati** za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo **glive iz rodov *Alternaria* in *Cercospora* (*Alternaria* spp. in *Cercospora* spp.)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 5-10 L vode. Tretirajte v fazi razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40-49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- v **čebuli in česnu** za zatiranje **porove škrlatne pegavosti (*Alternaria porri*)**, odmerku 5 ml na 100 m² na 1-5 L vode. Tretirajte od razvojne faze, ko se listna osnova prične debeliti oz. sirti, do razvojne faze, ko čebulica doseže 50 % pričakovane premera (BBCH 40-45), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- v **jagodah** za zatiranje **jagodne pepelovke (*Sphaerotheca* spp.)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 3-10 L vode. Tretirajte na začetku vegetacije, pred cvetenjem (BBCH 68-89) največ dvakrat v eni rastni sezoni, z najmanj 7-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- na **šnarolihi** za zatiranje **beluševе rje (*Puccinia asparagi*)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 3-12,5 L vode. Tretirajte po pobiranjem, največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- na **okrasnih rastlinah** za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo **glive iz rodov *Alternaria*, *Cercospora*, *Colletotrichum*, *Erysiphe*, *Phragmidium*, *Puccinia*, *Phyllosticta*, *Ramularia*, *Septoria*, *Stemphylium* in *Uromyces*** v 0,05 % koncentraciji in izhodski porabi vode 10 l na 100 m² (5 ml na 10 L vode). Tretirajte lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjem.

FITOTOKSIČNOST

Pri priporočeni uporabi sredstvo ne bo poškodovalo navedenih gojenih rastlin.

2. MANJŠE UPORABE

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva **Score 250 EC** pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinih ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik sredstva. Te uporabe so:

- v **pastinaku** za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo **glive iz rodov *Erysiphe* in *Alternaria* (*Erysiphe* spp. in *Alternaria* spp.)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 1-5 L vode. Tretirajte v fazi razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40-49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- v **drobnjaku** za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo **glive iz rodu *Alternaria* (*Alternaria* spp.)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 1-5 L vode. Tretirajte v od razvojne faze, ko se listna osnova prične debeliti oz. sirti, do razvojne faze, ko čebulica doseže 50 % pričakovane premera (BBCH 40-45), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjem;
- v **petersilju** za **listje** za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo **glive iz rodov**

Septoria, Erysiphe in Alternaria (Septoria spp., Erysiphe spp. in Alternaria spp.) v odmerku 5 ml na 100 m² na 3-5 l vode. Trejirate v fazi razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40-49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema;

- v **zelščih** za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo **glive iz rodov Septoria, Erysiphe in Alternaria (Septoria spp., Erysiphe spp. in Alternaria spp.)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 3-5 l vode. Trejirate lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema;

- na **špargljih** za zatiranje **beluševne rjave pegavosti (Stemphylium vesicarium)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 3-12,5 l vode. Trejirate po pobiranju, največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema;

- v **hrenu** za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo **glive iz rodu Alternaria (Alternaria spp.)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 4-10 l vode. Trejirate lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 4-dnevnim razmikom med tretiranjema;

- na **malinah in robidih** za zatiranje rje (**Phragmidium spp.**), **sušice (Didymella spp.)**, **listnega oziga (Drepanopeziza spp.)** in **pepelovke (Sphaerotheca spp.)** v odmerku 4 ml na 100 m² na 6-10 l vode. Trejirate od razvoja listov do pojava sovčetij (BBCH 13-49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 7-dnevnim razmikom med tretiranjema;

- v **ameriških borovnicah** za zatiranje **cvetne monilije (Monilia vaccinii-corymbosi)** v odmerku 4 ml na 100 m² na 10 l vode. Trejirate pred cvetenjem (od začetka brstenja do cvetenja), največ enkrat v eni rastni sezoni;

- na **slivah** za zatiranje **navadne sadne gnilobe (Monilia spp.)**, **čespljeve rje (Puccinia pruni)** in **pepelovke (Sphaerotheca spp.)** v odmerku 2,2 ml na 100 m² na 15 l vode. Trejirate od ravnice faze, ko so odprti prvi cvetovi, do najpозnejše 14 dni pred obiranjem (od BBCH 60), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 10-dnevnim razmikom med tretiranjema;

- v **črnem korenu** za zatiranje **pepelovke kobulnic (Erysiphe heraclei)** in **korenjevega listnega oziga (Alternaria dauci)** v odmerku 5 ml na 100 m² na 1-5 l vode. Trejirate lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 4-dnevnim razmikom med tretiranjema.

OPOZORILO

Pri tretiranju upoštevajte napovedi opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin oz. pogoje za nastanek okužbe.

PREPREČEVANJE RAZVOJA ODORNOSTI

V praksi obstaja verjetnost razvoja odpornosti na fungicide iz skupine DMI, če se jih na isti površini uporablja večkrat zaporedoma. Pojavi rezistence se lahko izogne z menjanjem ali mešanjem sredstev, ki imajo različne načine delovanja. Zato se na isti površini, kjer se goji vse registrirane gojene rastline, sme uporabljati fungicid **Score 250 EC** in druge fungicide iz skupine DMI največ dvakrat v eni rastni sezoni, v nasadih jabolčan in hrušk pa največ trikrat v eni rastni sezoni.

VAROVANJE OKOLJA:

Pri tretiranju morate preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov morate pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas:

- 15 m tlorsne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorsne širine od meje brega voda 2. reda pri tretiranju krompirja, oljne ogrščice, solate, čebule, česna, drobnjak, peteršilja, zeljšč, pastirnaka, zelene, sladkorne, krmne tre rdeče pese, zelja, brokolija, cvetače, ohrovtu, brstičnega ohrovtu, kitajskega zelja, bučnice z užitino in nežitino lupino, črnega korena, hrena; jagod in okrasnih rastlin (rastline, ki so nižje od 50 cm);
- 30 m tlorsne širine od meje brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju marelic, breskev, nektarin, sliv in oljk;
- 20 m tlorsne širine od meje brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju jabolčan, hrušk, paradiznika, špargljev in okrasnih rastlin (rastline, ki so višje od 50 cm);
- 15 m tlorsne širine od meje brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju malin, robid in ameriških borovnic;
- 15 m tlorsne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorsne širine od meje brega voda 2. reda pri tretiranju trte.

MEŠANJE Z DRUGIMI SREDSTVI

Možno je mešanje z večino drugih fungicidov, ki jih uporabljamo na zgoraj navedenih gojenih rastlinah. Pred pripravo skupine brozge priporočamo, da se o mešanju z drugimi sredstvi posvetujete z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstev.

PRIPRAVA SKROPLINE BROZGE

Prepričajte se, da je skroplilnica zares čista, čim bolj natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam na koncu ne bo ostajala. Napolnite rezervoar skroplilnice do 1/2 potrebne količine z vodo in med stalnim mešanjem dodajte potrebno količino sredstva, nato dolijte še preostalo vodo. Če pripravljate mešanico z več sredstvi, najprej dodajte sredstvo **Score 250 EC**, šele nato dodajte ostala sredstva. Če dodajate sredstva v vodotopnih vrečkah, potem najprej dodajte v skroplilnico ta sredstva. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe pripravljene mešanice.

KARENCA

- oljke — 30 dni;
- sladkorna, krmna in rdeča pesa — 28 dni;
- trta za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, jabolka, hruške, zelje, brokoli, cvetača, ohrovt, brstični ohrovt, kitajskega zelja, krmna pesa, ki se krmi živalim — 21 dni;
- peteršilj, pastinak, gomoljani in stebelna zelena, solata, česen, čebula, drobnjak, zeljšča, črni koren, hren, slive — 14 dni;
- breskve, nektarine, marelice, paradiznik — 7 dni;
- krompir, oljna ogrščica, bučnice z užitino in nežitno lupino, maline, robide, jagode — 3 dni;
- šparglji in ameriške borovnice — zagotovljeno s časom uporabe;
- okrasne rastline — karenci ni potrebna.

ZAŠČITA UPORABNIKA

Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju skroplilne brozge, polnjenju oz. čiščenju rezervoarja, morate uporabljati zaščito za oči/obraz (ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča se zaščitna očala). Priporočamo tudi uporabo primerne zaščitne obleke z

dolgimi rokavi (delovni kombinizon) in zaščitnih rokavic. Pri stiku s tretiranimi rastlinami priporočamo uporabo primerne delovne obleke (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) in rokavice.

DELOVNA KARENCA

Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane rastline posušijo.

ZNAKI ZASTRUPITVE

Znaki zastrupitve pri ljudeh do sedaj niso poznani. V primeru zastrupitve s sredstvom je pričakovati predvsem simptome zaradi izpostavljenosti aromatskim ogljikovodikom pri zaužitju, ter pojav slabosti in bruhanja, vnetja želodca in črevesja. Zaradi pljučne aspiracije lahko pride do kašljanja, dvigljenja, dušenja, pospešenega in oteženega dihanja in do kemičnega pneumonitisa. Možni so znaki sistemske toksičnosti npr. glavobol, zmedenost, omedevična in v hujših primerih motnje koordinacije, motnje srčnega ritma, poskodbe jeter in ledvic, koma, zastoj dihanja. Pri stiku s kožo ali očmi lahko pride do lokalnega vnetja, opeklin, ali poskodbo roženice. Kronična izpostavljenost lahko povzroči vnetje kože.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo čim prej umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor ter jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovite osnovne življenjske funkcije. Takoj pokličite zdravnika in mu pokážite podatke o sredstvu, ki so na originalni embalaži in/ali v navodilu za uporabo sredstva.

Pri vdihavanju: Sprostite dihalne poti in ravnajte v skladu s splošnimi ukrepi.
Stik s kožo: Takoj odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo pa temeljito umijte z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja, pokličite zdravnika. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem razprite očesni veki in oči temeljito spirajte s čisto vodo 15 minut. Odstranite kontaktna leče, če jih prizadeti ima in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. V primeru draženja oči se posvetujte z zdravnikom ali okulstom.

Pri zaužitju: Usta sperite z vodo. Ponesreženih naj popije do 2 dl vode. Ne izzivajte bruhanja. Takoj pokličite zdravnika in mu pokážite originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. Osebi z moteno zavestjo ne smete dati ničesar piti, niti ji ne smete izzivati bruhanja.

Navodilo za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičnega protistrupa ni. Zdravljenje je simptomatično.

UKREPI V PRIMERU NENAMERNEGA IZPUSTA

V primeru nenamerne izpušte obvezno uporabljajte osebna zaščitna sredstva: gumijaste skornje, neporozna obleka in rokavice, varovalno masko s filtrom za tekočine. Po končanem delu se morate srbeni umiti (najbolje oprati).

V zaprtem prostoru: Če se embalaža poskuduje in sredstvo razlije, je treba razlizo tekočino posipati z nevnetljivim vpojnim sredstvom (zemlja, pesek, žagovina) in vse skupaj pobrati v posebno, za ta namen določeno in označeno posodo. Vsebineto te posode je treba predati v uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Takoj je treba ločiti poskodovano embalažo od neposkodovane. V primeru požara gasite s peno, CO₂ ali vodo, vendar ne z direktnim curkom. To vodo je treba dekontaminirati, preden očišče v kanalizacijo.

Na prostem: Ravnanje enako kot je navedeno zgoraj. Če je do razliza prišlo na zemljišču, odstranite tudi vrhno plast zemlje.
Pri prevozu: ugasnite motor vozila in ne kadite. Zavarujte mesto nezgode in nanjo opozorite ostale udeležence v prometu. O nezgodi obvestite Centro za obveščanje na tel. št.: 112. Ločite poskodovano embalažo od neposkodovane in ravnajte naprej, kot je navedeno zgoraj.

POSTOPEK Z OSTATKOM SREDSTVA IN S PRAZNO EMBALAŽO

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, morate oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izpraznjeno (velja za plastenke in steklenke) embalažo lahko odstranite kot nevarnen odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlize v skroplilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo oprano embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Odlobčo št.: U34330-169/2013/7 z vsemi spremembami je izdal MKGP, UVHVR.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži. Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.

24 ura dežurna služba, tel.: 00 44 1484 538 444, Syngenta Alarm centre, Huddersfield, Velika Britanija oz. Klic v silii: 112.

Navodilo za uporabo je v skladu z odlobčo o registraciji.

Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Proizvajalec ne jamči za delovanje sredstva, če pri uporabi le-tega niso upoštevane vse navedene opozoritve in opozorila. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja sredstva, proizvajalec ne odgovarja.

Datum proizvodnje, rok uporabe in številka sarže: na embalaži.

Proizvajalec in imetnik registracije: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

© zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© 2018 Syngenta Crop Protection AG