


# VERTIMEC® PRO

**Koncentrirana suspenzija (SC); insekticid - akaricid namenjen za uporabo na trti, hmelju, določenih sadnih rastlinah, vrtninah in na okrasnih rastlinah.**

**Vertimec Pro** vsebuje: **abamektin** — 18 g/L (1,7 % w/w), CAS št.: 71751-41-2 (mešanica 80 % avermekтина B1a in 20 % avermekтина B1b).



**NEVARNO  
ZA ČEBELE**

Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas tlorisne širine 40 m od meje brega voda 1. in 2. reda v nasadih agrumov in sadovnjakih, 30 m od meje brega voda 1. in 2. reda v hmelju, 15 m od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega voda 2. reda v primeru uporabe na trti in vrtninah ter okrasnih rastlinah, ki so višje od 50 cm, 15 m od meje brega voda 1. reda in 5 m pas od meje brega voda 2. reda pri ostalih uporabah.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01 436 12 03; faks: 01 436 12 14 v sodelovanju z **Unichem d.o.o.**, Sinja Gorica 2, Vrhnika, tel.: 01/1558 152, [www.unichem.si](http://www.unichem.si)

**Vsebina: 10 ml / 25 ml**

**Skladiščenje:** v originalni, zaprti embalaži, v zravnem prostoru, zaščiteno pred soncem in vlago, pri temperaturah med 0 in +35 °C, zaklenjeno, nedostopno otrokom, nepočenim osebam in domačim živalim. Sredstva ne hranite v istem prostoru skupaj s hrano, pijačo in krmili.

## Navodilo za uporabo

### Uporaba:

- Sredstvo **Vertimec Pro** se uporablja kot kontaktni in želodčni insekticid ter akaricid:
- na **trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja** za zmanjševanje številčnosti populacije **pasastega (Eupoecilia ambiguella)** in **kristazega grozdnega sukača (Lobesia botrana)** ter za zatiranje **gabrove pršice (Eotetranych carpini)**, **navadne pršice (Tetranychus urticae)** in **rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi)** v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode ter **trsnе pršice (Colomerus vitis)** v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode;
  - na **breskvah, nektarinah in marelicah** za zatiranje **navadne pršice (Tetranychus urticae)** in **breskove rjaste pršice (Aculus fockeui)** v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode in za zatiranje **rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi)** v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode;
  - na **slivah** za zatiranje **navadne pršice (Tetranychus urticae)** v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode in **rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi)** v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode;
  - na **agrumih** za zatiranje **rdeče agrumove pršice (Panonychus citri)**, **navadne pršice (Tetranychus urticae)** in **agrumovega listnega zavrtča (Phyllocnistis citrella)** v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode;
  - na **dinjah, lubenicah in bučah na prostem in v zaščitnih prostorih** za zatiranje **pršic iz rodu Tetranychus** v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m<sup>2</sup>

### Pozor

Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Hraniti zunaj dosega otrok. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov/embalaže.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

- na 10 L vode ter za zmanjševanje populacije **resarjev iz rodu Frankliniella** in **listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza** v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 L vode;
- na **jagodah na prostem in v zaščitnih prostorih** za zatiranje **navadne pršice (Tetranychus urticae)** v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 L vode in za zmanjševanje populacije **resarjev iz rodu Frankliniella** v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 L vode;
- na **endiviji na prostem** za zmanjševanje populacije **listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza** v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 L vode;
- na **solati na prostem** za zatiranje **navadne pršice (Tetranychus urticae)** v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode in za zmanjševanje populacije **resarjev iz rodu Frankliniella** in **listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza** v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode;
- na **okrasnih rastlinah** za zatiranje **navadne pršice (Tetranychus urticae)** v največjem dovoljenem odmerku 7,5 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode in za zmanjševanje populacije **listnih zavrtalk (Liriomyza spp.)** ter **resarjev (Thripidae)** v največjem dovoljenem odmerku 10 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode.
- na **jablanih** za zatiranje **jablanske bošice (Psylla mali)**, **navadne pršice (Tetranychus urticae)**, **rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi)** in **jablano rjaste pršice (Aculus schlechtendali)** v največjem dovoljenem odmerku 11,25 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode. Sredstvu se lahko doda sredstvo na podlagi parafinskega olja v 0,3 % koncentraciji;
- na **hruškah in kutinah** za zatiranje **navadne hruseve bošice (Cacopsylla pyri)**, **jablano rjaste pršice (Psylla mali)**, **navadne pršice (Tetranychus urticae)**, **rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi)** in **listnih pršic (Aculus spp.)** ter za zmanjševanje številčnosti populacije **hruseve rjaste pršice (Epirimerus pyri)** v največjem dovoljenem odmerku 11,25 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode. Sredstvu se lahko doda sredstvo na podlagi parafinskega olja v 0,3 % koncentraciji;
- na **bučkah, kumarah in kumaricah za vlaganje na prostem in v zaščitnih prostorih** za zatiranje **pršic iz rodu Tetranychus** v največjem dovoljenem odmerku 11,25 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 l vode ter za zmanjševanje populacije **resar-**

**jev iz rodu *Frankliniella* in *Thrips*** v največjem dovoljenem odmerku 12 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 L vode.;

- na **parpliki in jajčevcu** na prostem in v zaščitnih prostorih za zatiranje **pršic iz rodu *Tetranychus*** v največjem dovoljenem odmerku 11,25 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 L vode ter za zmanjševanje populacije **resarjev iz rodu *Frankliniella* in listnih zavrtalk iz rodu *Liriomyza*** v največjem dovoljenem odmerku 12 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 L vode.

- na **paradižniku na prostem in v zaščitnih prostorih** za zatiranje **pršic prekl iz rodu *Tetranychus* ter paradižnikove pršice (*Aculus lycopersici*)** v največjem dovoljenem odmerku 11,25 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 L vode ter za zmanjševanje populacije **resarjev iz rodu *Frankliniella* in *Thrips* ter listnih zavrtalk iz rodu *Liriomyza*** v odmerku 12 ml na 100 m<sup>2</sup> na 10 L vode.

### Čas tretiranja:

Tretirajte ob pojavu škodljivca, ko ta preseže prag škodljivosti. Sredstvo dobro deluje predvsem na ličinke.

### Opozorila:

Na isti površini se sredstvo lahko uporabi največ dvakrat v eni rastni dobi. Ne tretirajte, če je zelo vroče ali če pihava veter s hitrostjo, večjo od 5 m/s, ali če pričakujete, da bo v kratkem deževalo. Zaradi razmeroma hitre razgradnje se za boljše delovanje priporoča tretiranje v večernih urah.

**Sredstvo je nevarno za čebele.** Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk oprashačevalcev ne smete tretirati rastlin med cvetenjem in v prisotnosti cvetočega plevela. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varovanja voda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevajte netretiran varnostni pas širine 40 m od meje brega voda 1. in 2. reda v nasadih agrumov in sadovnjakih ter 30 m od meje brega voda 1. in 2. reda v hmelju. Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevajte netretiran varnostni pas širine 15 m od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega 2. reda v primeru uporabe na trti in vrtninah ter okrasnih rastlinah, ki so višje od 50 cm (paradižnik, kumare, kumarice za vlaganje). Za vse ostale uporabe upoštevajte netretiran varnostni pas širine 15 m od meje brega voda 1. reda in 5 m pas od meje brega voda 2. reda.

### Fitotoksičnost (škodljivost za gojene rastline):

Če sredstvo uporabljate v skladu s temi navodili, ne bo poškodovalo tretiranih gojenih rastlin.

### Mešanje z drugimi sredstvi:

Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi.

### Priloga škropilne brozge:

Rezervoar škropilnice napolnite do 1/2 potrebne količine s čisto vodo, vključite mešalo in dodajte natančno izračunano količino sredstva. Med stalnim mešanjem dolijte še preostalo količino vode. Mešalo mora biti vključeno tudi ves čas tretiranja. Pripravite samo toliko škropilne brozge, kot je potrebujete, da vam ne bo ostajala.

### Karenca:

Za jagode, dinje, lubenice, buče, paradižnik, jajčevce, kumare, kumarice za vlaganje, bučke in papriko 3 dni; za solato, endivijo, jabolka, hruške in kutine 7 dni; za agrume 10 dni; za breskve, nektarine in marelice 14 dni; za hmelj, trto in slive 28 dni.

**Delovna karenc:** vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga posuši.

### Zaščitna oprema:

Pri rokovanju s sredstvom in škropivom morate uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno obleko.

### Znaki zastrupitve:

Sredstvo lokalno draži kožo in oči, stik s kožo lahko povzroči preobčutljivostno reakcijo. Intenzivno vdihavanje razpršenih delcev oziroma zaužitje večje količine koncentriranega sredstva draži sluznico dihal in prebavnega trakta, sistemsko pa povzroči nekoordiniranost gibov, tremor, krče, motnjo zavesti, hipotenzijo in težko dihanje.

### Prva pomoč:

**Splošni ukrepi:** prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja v dobro prezračen prostor ali na svež zrak in jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovite osnovne življenjske funkcije, takoj se posvetujte z zdravnikom in mu posredujte podatke o sredstvu, ki so na originalni embalaži in v navodilu za uporabo.

**Stik s kožo:** odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo pa temeljito umijte z milom in vodo. V primeru draženja se posvetujte z zdravnikom.

**Stik z očmi:** s palcem in kazalcem razprite očesni vekli in oči temeljito sperite s čisto vodo. V primeru draženja se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

**Pri vdihavanju:** ravnajte po splošnih ukrepih in pokličite zdravnika.

**Pri zaužitju:** usta sperite z vodo in dajte piti do 2 dl vode. Ne izzivajte bruhanja. Osebi z moteno zavestjo ne smete dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja. Pokličite zdravnika.

### Nujna zdravniška pomoč:

Zagotovite in vzdržujte osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju sredstva dajte prizadeti osebi aktivno oglje 1 g/kg telesne teže, razredčeno z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca. Prizadeti ne sme uživati mlečnih ali alkoholnih pijač.

**Specifičen antidot ni znan. Zdravljenje je simptomatično.**

### Ukrepi pri nezgodi:

**V zaprtim prostoru:** Če se embalaža poškoduje in se sredstvo razlije, ga posipajte z vpojnim sredstvom (zemlja, pesek, žagovina), vse skupaj poberte in spravite v posebno, za to določeno in označeno posodo. Vsebin to posode oddajte v uničenje udeležencu, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Tla očistite z vodo in detergentom ali raztopino sode. Pri tem delu uporabljajte osebna zaščitna sredstva. V primeru požara gasite s prahom, peno, CO<sub>2</sub> ali razpršeno vodo.

**Pri prevozu:** Ugasnite motor in ne kadite, zavaruje mesto nezgode, opozorite nanjo ostale udeležence v prometu in pokličite Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Preprečite, da bi razlita tekočina odtokla v kanalizacijo ali druge vodne poti s posipanjem z vpojnim materialom ali z nasipom. Poberte razlito sredstvo in dalje ukrepajte, kot je navedeno zgoraj.

### Postopek z ostankom sredstva in prazno embalažo:

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnanje morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadke skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbiralske odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Odločbo št.: **34330-11/2011/1001** z vsemi spremembami je izdal MKGP, UVHVVR.

### Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

**V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.**

**Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži. Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.**

**Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.**

**Sredstvo je namenjeno samo tržnim pridelovalcem.**

**Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.**

**Datum proizvodnje, rok uporabe in številka šarže:** so odtisnjeni na embalaži.

Proizvajalec jamči za kvaliteto sredstva, dokler je v originalni embalaži. Proizvajalec ne jamči za delovanje sredstva, če pri uporabi le-tega niso upoštevane vse navedene omejitve in opozorila. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja sredstva, proizvajalec ne odgovarja.

24 urna dežurna služba, tel.: 00 44 1484 538 444, Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Velika Britanija oz. Klic v sili: 112.

Proizvajalec in imetnik registracije: **Syngenta Crop Protection AG**, Basel, Švica

® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© 2017 Syngenta Crop Protection AG