

Fungicid širokega spektra v obliki koncentrirane suspenzije (SC) za zatiranje boleznih na poljskih, vrtnih, jagodah, hmelju in okrasnih rastlinah.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo. V primeru zastupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečenu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži. Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena. Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Odločbo št.: U34330-05/2014/8 z vsemi spremembami izdal MKGP, UHVHVV.

Klic v sili: 112.

Ortiva vsebuje: azoksistrobin – 250 g/L (22,8 % w/w), CAS št.: 131860-33-8.

NAČIN DELOVANJA

Sredstvo Ortiva je sistemski (translaminarni) fungicid širokega spektra s preventivnim delovanjem in dodatnim kurativnim delovanjem. Priporoča se uporaba pred začetkom okužbe. Aktivna snov *azoksistrobin* sodi v skupino strobilurinov, ki delujejo na respiratorni sistem gliv.

UPORABA

a) GLAVNE UPORABE

Sredstvo Ortiva se uporablja:

- na **kumarah**, gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru, za zmanjševanje okužb **kumarne plesni** (*Pseudoperonospora cubensis*) in **pepelovk bučnic** (*Erysiphe* sp., *Sphaerolecta* sp.) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 5-12 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvitih šest pravih listov na glavni vreži, do polne zrelosti plodov (BBCH 16-89). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 10 dni;
- na **kumaricah za vlaganje**, gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru, za zmanjševanje okužb **kumarne plesni** (*Pseudoperonospora cubensis*) in **pepelovk bučnic** (*Erysiphe* sp., *Sphaerolecta* sp.) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-10 L na 100 m² na prostem in 2-15 L na 100 m² v zaščitenem prostoru. Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvitih šest pravih listov na glavni vreži, do polne zrelosti plodov (BBCH 16-89). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 10 dni;
- na **bučkah**, gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru, za zmanjševanje okužb **kumarne plesni** (*Pseudoperonospora cubensis*) in **pepelovk bučnic** (*Erysiphe* sp., *Sphaerolecta* sp.) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 5-12 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvitih šest pravih listov na glavni vreži, do polne zrelosti plodov (BBCH 16-89). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 10 dni;
- na **bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč)**, gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru, za zmanjševanje okužb **kumarne plesni** (*Pseudoperonospora cubensis*) in **pepelovk bučnic** (*Erysiphe* sp., *Sphaerolecta* sp.) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 5-12 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvitih šest pravih listov na glavni vreži, do polne zrelosti plodov (BBCH 16-89). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 10 dni;
- na **šparglih** za zmanjševanje okužb **beluševje rje** (*Puccinia asparagi*) in **beluševje rjave pegavosti** (*Stemphylium vesicarium*) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 3-10 L na 100 m². V rodnih nasadih lahko šparglje tretirate samo po spravilu pridelka, v ravninski fazi, ko je rast stabilna končana do polne zrelosti plodov (BBCH 39-89). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 10 dni;
- na **paradižniku, papriki in jajčevcu**, gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru, za zatiranje **paradižnikove pepelovke** (*Leveillula taurica*), **paradižnikove plesni** (*Phytophthora infestans*), **črne listne pegavosti paradižnika** (*Alternaria solani*) in **pepelovk** (*Erysiphe* sp.) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 4-12 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvitih šest pravih listov, do polne zrelosti plodov (BBCH 16-89). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 12 dni;
- v **brokoliju, glavnem zelju, brstičnem ohrovtu, kitajskem kapusu, glavnem ohrovtu, listnatem ohrovtu in cvetelci** na prostem za zatiranje **kapsune plesni** (*Peronospora parasitica*) in **pepelovk** (*Erysiphe* sp.) ter za zmanjševanje okužb **bele rje kriznic** (*Albugo candida*), **črne listne pegavosti kapsunic** (*Mycoapharella brassicicola*) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvitih šest pravih listov, do značilne velikosti, oblike in čvrstosti gliv (BBCH 16-49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 12 dni;
- v **grahu za strošje in zrnje (suho in sveže)**, ter **krmnem grahu** za zatiranje **grahove rje** (*Uromyces pisi*) in **grahove pepelovke** (*Erysiphe pisi*) in za zmanjševanje okužb **grahove pegavosti** (*Mycoapharella pinodes*), **grahove plesni** (*Peronospora viciae* f. sp. *pisi*) in **grahove pegavosti** (*Ascochyta pisi*) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-5 L na 100 m². Grah za strošje tretirajte od razvojnne faze, ko je viden prvi cveteli popok, do konca cvetenja (BBCH 51-69), grah za zrnje pa od razvojnne sedmega pravega lista do razvojnne faze, ko je 20 % strokov doseglja značilno (BBCH 17-72). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 14 dni;
- v **fižolu za strošje in zrnje (suho in sveže)**, **bobu** ter **volčjem bobu** na prostem za zatiranje **rje** (*Uromyces pisi*) in **pepelovk** (*Erysiphe* sp.) ter za zmanjševanje okužb **pegavosti** (*Mycoapharella* sp.), **plesni** (*Peronospora* sp.) in **grahove pegavosti** (*Ascochyta* sp.) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 1,5-8 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvit sedmi pravi list, do razvojnne faze, ko je 20 % strokov doseglja značilno (BBCH 17-72). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 14 dni;
- v **česnu**, **poru šalotki**, **drobnjakih čebuli** in **spomadlanskih čebuli** na prostem za zatiranje **čebulne rje** (*Puccinia allii*) in **čebulne cernole** (*Cladosporium allii-cepae*), ter za zmanjševanje okužb **čebulne plesni** (*Peronospora destructa*), **porove škrlatne pegavosti** (*Alternaria porri*), **sive plesni** (*Botrytis* sp.) in **papirnatih boleznih listja pora in čebule** (*Phytophthora porri*) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-5 L na 100 m² za česen, čebulo, spomadlansko čebulo in šalotko, 2-10 L na 100 m² za por za 3-12 L na 100 m² za drobnjak. Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojnne faze, ko je upognjenih 50 % listov v poro (BBCH 16-48). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni, razen v spomadlanskih čebuli in šalotki, ki jih lahko tretirate največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni pri tretiranju česna, šalotke, drobnjaka in čebule, 10 dni pri tretiranju spomadlanske čebule ter 12 dni pri tretiranju pora;
- v **solati**, **endiviji**, **rukoli**, **listnatem radiču** in **posevkih mladih listov ter pooganikov vrtnih**,

- ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista**, gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru, za zmanjševanje okužb **solatne plesni** (*Bremia lactucae*) in **pepelaste plesni** (*Erysiphe cichoracearum*) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m² pri tretiranju solate ter pri porabi vode 3-12 L na 100 m² za endivijo. Treatirajte se od razvojnne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojnne faze, ko so listi oziroma je glava značilne velikosti, oblike in čvrstosti (BBCH 14-49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni;
- v **radiču za siljenje in vitlofu** na prostem za zmanjševanje okužb **solatne plesni** (*Bremia lactucae*) in **radičeve pepelovke** (*Erysiphe cichoracearum*) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojnne faze, ko so listi oziroma je glava značilne velikosti, oblike in čvrstosti (BBCH 14-49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 21 dni.
- Opozorilo:** Liste, odstranjene s korenja radiča za siljenje in vitlofa, se lahko uporabljajo po preteku karence. Korenina radiča za siljenje se ne sme uporabljati za prehrano ljudi in živali;
- v **radiču za siljenje in vitlofu** v času siljenja v prostoru za siljenje za zmanjševanje okužb **solatne plesni** (*Bremia lactucae*) in **radičeve pepelovke** (*Erysiphe cichoracearum*) v odmerku 10 mL na 100 m². S sredstvom lahko radič za siljenje tretirate največ enkrat v eni rastni sezoni.
- Opozorilo:** Liste, odstranjene s korenja radiča za siljenje in vitlofa, se lahko uporabljajo po preteku karence. Korenina radiča za siljenje se ne sme uporabljati za prehrano ljudi in živali;
- v **korenju** na prostem za zatiranje **pepelovke kobulnic** (*Erysiphe heraclei*) in za zmanjševanje okužb **korenjevega listnega ožiga** (*Alternaria dauci*) in **sive pegavosti korenjevega listja** (*Cercospora carotae*) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojnne faze, ko je debeljenje zaključeno in je koren doseglja značilno obliko in velikost (BBCH 16-49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni;
- v **redkvi** in **redkvici** na prostem za zatiranje **kapsune plesni** (*Peronospora parasitica*) ter zmanjševanje okužb **bele rje kriznic** (*Albugo candida*) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je rastlina doseglja tehnološko in fiziološko zrelost (BBCH 16-49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni;
- v **kolerabici** na prostem za zatiranje **kapsune plesni** (*Peronospora parasitica*) in **pepelovk** (*Erysiphe* sp.) ter za zmanjševanje okužb **bele rje kriznic** (*Albugo candida*), **obročaste pegavosti kapsunic** (*Mycoapharella brassicicola*) in **glivičnih listnih pegavosti** (*Alternaria* sp.) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojnne faze, ko je rastlina doseglja tehnološko in fiziološko zrelost (BBCH 16-49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 12 dni;
- v **rumeni (podzemni) kolerabi** na prostem za zmanjševanje okužb **glivičnih listnih pegavosti** (*Alternaria* sp.) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojnne faze, ko je rastlina doseglja tehnološko in fiziološko zrelost (BBCH 16-49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 12 dni;
- v **gomoljni in belušni zeleni** na prostem za zatiranje **listne pegavosti zelene** (*Septoria apicala*) in **pepelovk** (*Erysiphe* sp.) ter za zmanjševanje okužb **glivičnih listnih pegavosti** (*Alternaria* sp.) in **listne pegavosti** (*Cercospora* sp.) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojnne faze, ko je rastlina doseglja tehnološko in fiziološko zrelost (BBCH 16-49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 14 dni;
- v **petrušlju** (za pridelavo korena) na prostem za zatiranje **listne pegavosti zelene** (*Septoria apicala*) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojnne faze, ko je rastlina doseglja tehnološko in fiziološko zrelost (BBCH 16-49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 14 dni;
- v **pastinaku** za zatiranje **pepelovke kobulnic** (*Erysiphe heraclei*) in za zmanjševanje okužb **korenjevega listnega ožiga** (*Alternaria dauci*) in **sive pegavosti korenjevega listja** (*Cercospora carotae*) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojnne faze, ko je rastlina doseglja tehnološko in fiziološko zrelost (BBCH 16-49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni;
- v **rdeli** in **krmni pesti** za zatiranje **pepelovk** (*Erysiphe* sp.) ter za zmanjševanje okužb **glivičnih listnih pegavosti** (*Alternaria* sp.) in **listne pegavosti** (*Cercospora* sp.) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojnne faze, ko je debeljenje zaključeno in je koren doseglja značilno obliko in velikost (BBCH 16-49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni;
- v **krompirju**: za zmanjševanje okužb **bele noge krompirja** (*Rhizoctonia solani*) in **krompirjevega ožiga** (*Colletotrichum coccodes*) v odmerku 30 mL na 100 m² pri porabi vode 0,5-1,5 L na 100 m² s tretiranjem tal pred ali ob setvi krompirja. Treatirajte pred vznikom krompirja (BBCH 00). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ enkrat v eni rastni sezoni;
- za zmanjševanje okužb **črne listne pegavosti krompirja** (*Alternaria solani*) v odmerku 5 mL na 100 m² pri porabi vode 2-8 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko so vidni prvi posamezni popki, do razvojnne faze, ko so jagode prve oploditve še zelene, samo rahlo obarvano (BBCH 51-85). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni;
- v **oljni ogrščici** za zmanjševanje okužb **črne listne pegavosti** (*Alternaria brassicicola*), **suhe trohnohe zlate** (*Leptosphaeria maculans*) in **bele gnilobe** (*Sclerotinia sclerotiorum*) v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-5 L na 100 m². Treatirajte od razvojnne faze, ko so prvi cveteli odprti, do konca cvetenja (BBCH 60-69). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ enkrat v eni rastni sezoni;
- v **psenicni ječmenu**, **rži** in **tritikali** za zatiranje **rje** (*Puccinia* sp.) in **rjavenja pšeninih plev** (*Leptosphaeria nodorum*) in za zmanjševanje okužb **listnega ožiga** (*Rhynchosporium secalis*)

v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-3 L na 100 m². Tretilrajte od razvojne faze začetek kolenčenja do konca cvetenja (BBCH 30-69). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 14 dni;

- v **jadogah** gojenih na prostem in v **zaščitenem prostoru**, za zmanjševanje okužb **jadogne pepelovke (*Sphaerotheca macularis*)** v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Tretirajte od razvojne faze, ko se pojavijo prvi nizi cvetov na dnu rozete, do razvojne faze, ko se pobira drugi pridelek in je vled povod obarvanih (BBCH 51-89). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni;
- na **okrasnih rastlinah**, gojenih na prostem in v **zaščitenem prostoru**, za zmanjševanje okužb z **rjami (*Puccinia* sp., *Melampsora* sp.)** ter za delno zmanjševanje okužb z **pepelovkami (*Podosphaera* sp.)** in **šipkovo pepelovko (*Sphaerotheca pannosa*)** v odmerku 4,8-9,6 mL na 100 m². Rastline do višine 50 cm tretirajte v odmerku 4,8 mL na 100 m², rastline visoke 50-125 cm v odmerku 7,2 mL na 100 m² in rastline višje od 125 cm v odmerku 9,6 mL na 100 m², pri porabi vode 6-12 L na 100 m². Tretirajte ob pojavu bolezni. S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 8 dni.

KARENCA

- 3 dni za kumare, kumarice za vlaganje, bučke, bučnice z neuzhito lupino (brez oljnih buč), paradižnik, papriko, jajčevac in jagode;
- 7 dni za spomladansko čebulo, fižol za stročje, redkev, redkovo in krompir;
- 14 dni za brokoli, cvetača, glavato zelje, kitajski kapus, glavni ohrvt, listni ohrvt, brstični ohrvt, grah za stročje, fižol za zrnje, česen, šalotko, drobnjak, čebulo, solato, endivijo, rukolo, listnati radič in posevke mladih listov ter pogonjakov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. prava lista, radič za siljenje in vitlof (gojen na prostem), korenje, rumeno (podzemno) kolerab, kolerabico, gomoljno in belušno zeleno, peteršilj (za pridelavo korena), pastinak, rdečo in krmno peso;
- 21 dni za por, radič za siljenje ter vitlof (gojen v zaščitenih prostorih) in oljno ogrščico;
- 35 dni za grah za zrnje, krmni grah, ječmen, tritikalo, pšenico, riž, in volčji bob;
- za šparglje je karenca zagotovljena s časom in načinom uporabe;
- za okrasne rastline karenca ni potrebna.

FITOTOKSIČNOST

Če sredstvo uporabljate v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne poškoduje gojenih rastlin. Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva, kar je fitotoksično za nekatere sorte jaboln.

b) MANJŠE UPORABE

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva **Ortiva** pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva **Ortiva** na navedenih gojenih rastlinah preizame uporabnik. Te uporabe so:

- na **hmelju** za zatiranje sekundarnih okužb s **hmeljno peronosporo (*Pseudoperonospora humuli*)** in **hmeljno sivo pegavostjo (*Phoma exigua*)** v odmerku 16 mL na 100 m² pri porabi vode 10-40 L na 100 m². Tretirajte od razvojne faze, ko so poleg razvitih listov vidni prvi cvetni brsti (od BBCH 50). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 14 dni;
- v **hrenu** za zatiranje **Kapusne plesni (*Peronospora parasitica*)**, **bele rji križnice (*Albugo candida*)** in **redkvice pegavosti (*Alternaria raphani*)** v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 2-6 L na 100 m². Tretirajte od razvitega 6. pravega lista dalje (od BBCH 16). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni;
- v **zeliščih za svežo uporabo in sušenje ter zeliščne čaje** za zatiranje **rij (*Uredinales*)** in **plesni (*Peronosporaceae*)** v odmerku 10 mL na 100 m² pri porabi vode 3-12 L na 100 m². Tretirajte od razvitega 4. pravega lista dalje (od BBCH 14). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 7 dni.

KARENCA

- 28 dni za hmelj,
- 14 dni za hren in zelišča.

VAROVANJE OKOLJA

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varovanja voda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju kumar, kumaric, fižola, graha, boba, volčjega boba, bučnic z neuzhito lupino (višjih od 50 cm), paradižnika in okrasnih rastlin upoštevajte netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m meje brega voda 2. reda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju hmelja upoštevajte netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju ostalih registriranih gojenih rastlin upoštevajte netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

MEŠANJE Z DRUGIMI SREDSTVI

O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO

Pred uporabo dobro pretresejte še zaprto embalažo. Odmernoj količino sredstva vlijte skito v rezervoar Škropilnice, ki je do polovice polne tekočine napojeno s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo do potrebne količine.

ZAŠČITA UPORABNIKA

Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju Škropilnice brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno Škropilnico ali pršilnikom ter med tretiranjem z ročno/oprtno Škropilnico morate uporabljati zaščito za dihala. Med pripravo Škropilnice mešanice in tretiranjem v zaščitenih prostorih (npr. v rastlinjaku) morate uporabljati zaščito za dihala ter primarno zaščitno obleko (delovni kombinizon) in zaščitne rokavice, ko se priključite tesen stik s tretiranimi rastlinami. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače).

DELOVNA KARENCA

Vstop delavcev brez zaščitne opreme je na tretirano površino dovoljen, ko se Škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

ZNAKI ZASTRUPITVE

ZNAKI ZASTRUPITVE pri ljudeh do sedaj niso poznani.

PRVA POMOČ

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo čim prej umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro zračen prostor; jo zavajajte pred mrazom oziroma vročino ter ji zagotovijo osnovne življenjske funkcije. Pokličite zdravnika in mu pokžite originalno embalažo in/ali navodila za uporabo sredstva. **Stik s kožo:** Takoj odstranite kontaminirano obleko in obutev ter tako temeljito umijte z vodo in milom. V primeru draženja se posvetujte z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem razprite oči vsaki veki ter oko temeljito sperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali oculusom.

Pri vdihavanju: Ravnavajte v skladu s splošnimi ukrepi.

Pri zaužitju: Ustla temeljito sperite z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj pokličite zdravnika. Ne izvajate bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izvajati bruhanja. Če je možno, zdravniku predložite navodila za uporabo.

Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifičen protipil ni poznan.

UKREPI V PRIMERU NENAMERNEGA IZPUSTA

Pri ukrepanju v primeru nenamernega izpusta obvezno uporabljajte osebna zaščitna sredstva: gumijaste škornje, nepropustno obleko in rokavice, varovalno masko s filtrom za tekočine. Po končanem delu se morate skrbno umiti (najbolje oprati).

V zaščitenem prostoru: Če se embalaža poškoduje in sredstvo razlije, je treba razlito tekočino posipati z nevnetljivim vpojnim sredstvom (zemlja, pesek, zagovina) in vsa skupaj pobrati v posebno, za ta namen določeno in označeno posodo. Vsebinsko te posode je treba predati v uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Takoj je treba ločiti poškodovano embalažo od nepoškodovane.

Na prostem: ravnavajte kot je navedeno zgoraj. Če se sredstvo razlije po zemlji, odstranite tudi vrhno plast zemlje.

Pri prevozu: ugasnite motor vozila in ne kadite. Zavarujte mesto nezgode in najpo opozorite ostale udeležence v prometu. O vozilu obvestite Center za varnostne zadeve na tel. št. 112. Ločite poškodovano embalažo od nepoškodovane in ravnavajte naprej, kot je navedeno zgoraj.

V primeru požara: gasite s peno, CO₂ ali vodo, vendar ne z direktnim curkom. To vodo je treba dekontaminirati, preden odteče v kanalizacijo.

POSTOPEK Z OSTATKOM SREDSTVA IN S PRAZNO EMBALAZO

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je patelel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnavajte morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevarne odpadke skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z netipirano in slabo očiščeno embalažo ravnavajte kot z nevarnim odpadkom.

Navodilo za uporabo je v skladu z odločbo o registraciji.

Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Proizvajalec ne jamči za delovanje sredstva, če pri uporabi le-taga niso upoštevane vse navedene omejitve in opozorila. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja sredstva, proizvajalec ne odgovarja.

© zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© 2018 Syngenta Crop Protection AG

POZOR

Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Prepreči vdihavanje meglice/hlapov/razpršila. PRI VDIHAVANJU: prenesi osebo na svež zrak in jo postavi v udoben položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Prestrči razlito tekočino. Odstrani vsebino/posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnavajte v skladu z navodili za uporabo. Vsebuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževate vodo. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakavati v bližini površinskih voda. Prepreči onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretirane varnostne pasove, kot so navedeni v navodilu.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01 436 12 03; faks: 01 436 12 14

Proizvajalec in imetnik registracije: **Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica**

© zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

Datum proizvodnje, rok uporabe in številka šarže: so odstnjeni na embalaži.

Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, v zračnem prostoru, zaščiten pred soncem in vlago, pri temperaturah med +5 in +35 °C, zaklenjeno, nedostopno otrokom, nepoučnim osebam in domačim živalim. Sredstva ne hranite v istem prostoru skupaj s hrano, pijačo in krmili.

