



FLORA VERDE NARAVNI INSEKTICID

Kontaktni insekticid na osnovi piretrina naravnega izvora je namenjen za zmanjševanje številčnosti križastega in pasastega grozdnega sukača na trti ter kot manjša uporaba za zatiranje ameriškega škržatka, plodove vinske mušice, listnih uši, resarjev oziroma rastlinjakovega ščitkarja na trti, paradižniku, jajčevcih, papriki, kumarah, solati in okrasnih rastlinah.

Sestava: Aktivna snov: piretrini 18,61 g/l (2% w/w), CAS št.: 8003-34-7

SKUPINA **3A** INSEKTICID

Pomožna sredstva: do 100% Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC). **Pred uporabo preberite navodilo za uporabo!**



POZOR



NEVARNO
ZA ČEBELE

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino / posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Način delovanja: FLORA VERDE je kontaktni insekticid, ki vsebuje piretrin naravnega izvora in rastlinsko olje. Odlikuje ga zelo hitro delovanje; učinek je takojšen.

NAVODILO ZA UPORABO

Glavne uporabe: FLORA VERDE se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozolja za zmanjševanje številčnosti križastega in pasastega grozdnega sukača (*Lobesia botrana* in *Eupoecilia ambiguella*) v 0,16% koncentraciji (16 ml / 10 l vode na 100 m²) oziroma v odmerku 1,6 l / ha ob porabi vode 1000 l / ha. Sredstvo se uporabi ob pojavu škodljivih žuželk (v času izleganja prvih ličink) oz. po napovedih opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. V primeru močnejšega napada se tretiranje čez 7-15 dni ponovi.

Fitotoksičnost: Če se sredstvo uporablja na predpisan način, ni fitotoksično.

Karenca: Karenca za trto je 3 dni.

Manjše uporabe: FLORA VERDE se uporablja na:

a) trti za pridelavo vinskega in namiznega grozolja za zatiranje: Ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) v 0,16% koncentraciji (16 ml / 10 l vode na 100 m²) oziroma v odmerku 1,6 l / ha ob porabi vode 1000 l / ha. Sredstvo se prvič uporabi proti ličinkam takoj po končanem cvetenju trte oz. po napovedih opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. V primeru močnejšega napada ali ugotovljene navzočnosti škodljivca se tretiranje čez 7-15 dni ponovi. **Plodove vinske mušice** (*Drosophila suzukii*) v 0,16% koncentraciji (16 ml / 10 l vode na 100 m²) oziroma v odmerku 1,6 l / ha ob porabi vode 1000 l / ha. Sredstvo se uporabi v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.

b) paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščiteneh prostorih za zatiranje listnih uši (*Aphididae*), resarjev (*Thrips spp.*) in rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*) v 0,2% koncentraciji (20 ml / 10 l vode na 125 m²) oziroma v odmerku 1,6 l / ha ob porabi vode 800 l / ha. Sredstvo se uporabi ob pojavu škodljivih žuželk.

c) papriki in kumarah v zaščiteneh prostorih za zatiranje listnih uši (*Aphididae*), resarjev (*Thrips spp.*) in rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*) v 0,2% koncentraciji (20 ml / 10 l vode na 125 m²) oziroma v odmerku 1,6 l / ha ob porabi vode 800 l / ha. Sredstvo se uporabi ob pojavu škodljivih žuželk.

d) solati za zatiranje listnih uši (*Aphididae*), resarjev (*Thrips spp.*) in rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*) na prostem v 0,27% koncentraciji (27 ml / 10 l vode na 167 m²) oziroma v odmerku 1,6 l / ha ob porabi vode 600 l / ha ter v zaščiteneh prostorih v 0,2% koncentraciji (20 ml / 10 l vode na 167 m²) oziroma v odmerku 1,18 l / ha ob porabi vode 600 l / ha. Sredstvo se uporabi ob pojavu škodljivih žuželk.

e) okrasnih rastlinah na prostem in v zaščiteneh prostorih za zatiranje listnih uši (*Aphididae*), resarjev (*Thrips spp.*) in rastlinjakovega ščitkarja (*Trialeurodes vaporariorum*) v 0,16% koncentraciji (16 ml / 10 l vode na 100 m²) oziroma v odmerku 1,6 l / ha ob porabi vode 1000 l / ha. Sredstvo se uporabi ob pojavu škodljivih žuželk.

Opozorilo: Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmaceutskega sredstva FLORA VERDE pri uporabi na zgoraj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmaceutskega sredstva FLORA VERDE na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

Karenca: Karenca za trto, paradižnik, jajčevce, papriko, kumare in solato je 3 dni. Za okrasne rastline karenca ni potrebna.

Mešanje z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi se ne priporoča.

Priprava sredstva za uporabo in uporaba: Pred uporabo vsebino dobro pretresite. Pripravite samo toliko škropiva kot ga boste porabili. Pripravljeno škropivo uporabite takoj (ga ne shranjujte).

Opozorila: Rastline, je potrebno s sredstvom dobro omočiti, tudi spodnjo stran listov. Priporoča se uporaba v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Sredstva se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Po potrebi se tretiranje ponovi čez najmanj 7 dni. S sredstvom se lahko na istem zemljišču oziroma v zaščitenem prostoru tretira največ trikrat v eni rastni sezoni. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte, paradiznika in okrasnih rastlin upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jajčevcev in solate upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk oprashačevalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem.

Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, med tretiranjem s traktorsko nošeno / vlečeno škropilnico / pršilnikom za rastline nizko nad tlemi ter med tretiranjem z ročno / oprtno škropilnico za rastline nizko nad tlemi mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice. Med pripravo škropilne mešanice in tretiranjem v zaščitenih prostorih (rastlinjakih) za rastline visoko nad tlemi mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinizon), zaščitno za dihala in zaščitne rokavice. Med pripravo škropilne mešanice in tretiranjem v zaščitenih prostorih (rastlinjakih) za rastline nizko nad tlemi mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinizon) in zaščitno za dihala.

Trta, vrtnine: Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in rokavice.

Okrasne rastline: Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati rokavice.

Delovna karenc: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

Znaki zastrupitve: Znaki zastrupitve pri ljudeh do sedaj niso poznani. Če se pojavijo znaki, ki kažejo na možnost zastrupitve, poklicati zdravnika in mu pokazati navodilo za uporabo. Pri astmatiku lahko sredstvo povzroči astmatični napad.

Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja in svez zrak ali v dobro prezračen prostor, sejo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in / ali navodilo za uporabo sredstva.

Pri vdihavanju: Ukrepati je treba tako, kot je navedeno v odstavku »Splošni ukrepi«.

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre vekci prizadetega očesa in oko temeljito spero s čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spero z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.

Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.

Navodilo za ravnanje v primeru izpusta sredstva v okolje: Preprečiti razlitje v kanale in vodotoke. Razlito sredstvo je potrebno posuti s peskom ali drugim nevetljivim absorpcijskim materialom ter nato pobrati. V zaprtih prostorih tla sprati z vodo in čistilnim sredstvom. Odpadne vode ne zlivati v odtočne kanale. Kontaminiran absorpcijski material in odpadno vodo oddati pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.

Ravnanje z ostanki sredstva in odpadno embalažo: Ostanke neuporabljene sredstva ali sredstvo, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo se lahko odstrani kot nenevaren odpadke. Tekočino od izpiranja izliti v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustiti pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnati kot z nevarnim odpadkom.

Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

Obseg jamstva: Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler se prodaja v originalno zaprti embalaži. Za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja sredstva, proizvajalec ne odgovarja.

Skladiščenje: Sredstvo shranjevati v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru, pri temperaturi med 5 in 50° C, zaščiteno pred toploto in neposredno sončno svetlobo, ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom.

Rok uporabe: 2 leti.

Datum proizvodnje in številka serije sta označena na embalaži.

Številka odločbe: U34330-111/2015/3 z dne 21.4.2016, MKGP Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, z vsemi spremembami.

Proizvajalec: Copyr S.p.A., Via G. Stephenson 29, 20157 Milano, Italija.

Vsebina: označena na pakiranju.

BIOLANTELLA FLORA VERDE 500 ml: Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

BIOLANTELLA FLORA VERDE 20 ml: Sredstvo se lahko prodaja brez potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Distributer in zastopnik:

UNICHEM

Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija
Tel.: +386 1 75 58 152, unichem@unichem.si
www.unichem.si