



# CHORUS® 50 WG

SKUPINA

9

FUNGICID

30143

**Fungicid v obliki močljivih zrn (WG) za zatiranje povzročiteljev škrlupa na jablanah, hruškah in kutinah ter monilij na breskvah, nektarinah, marelicah in slivah.**

**Pred uporabo preberite priloženo navodilo.**

**V primeru zastupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.**

**Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži.**

**Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.**

**Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.**

Odločbo št.: **3433-487/2009/5** z vsemi spremembami je izdal MKGP, UVHVVR.

Telefon za nujne primere: 112 KLIC V SILI

**Chorus® 50 WG** vsebuje: ciprodinil — 500 g/kg (50 % w/w), CAS št.: 121552-61-2.

## POZOR

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Prestreči razlito tekočino.

Odstraniti vsebino / posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Vsebuje ciprodinil. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.



**Zastopnik:** Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01 436 12 03

**Proizvajalec in imetnik registracije:** Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

**Distributer:** UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija, Tel.: +386 1 7558 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si

© zaščiten znak firme Syngenta Group Company

© 2020 Syngenta Crop Protection AG

**Skладиščenje:** v originalni, zaprti embalaži, zaklenjeno, v zračnem prostoru, zaščiten pred soncem in vlago, pri temperaturah nižjih od +35 °C

**Datum proizvodnje, rok uporabe in številka šarže:** so odtisnjeni na embalaži.

**Vsebina:** označeno na embalaži.

## NAČIN DELOVANJA

**Chorus 50 WG** je fungicid v obliki močljivih zrn s kontaktnim in sistemskim delovanjem.

## UPORABA

### 1. GLAVNE UPORABE

**Chorus 50 WG** se uporablja:

- na **jablanah, hruškah in kutinah** za zatiranje **škrlupa (*Venturia spp.*)** v odmerku 0,45 kg/ha (4,5 g/100 m<sup>2</sup>) največ 3 krat v eni rastni dobi, v časovnem razmiku 8-12 dni. Tretirajte v razvojni fazi od mišjega očesa do konca razvoja plodov (po BBCH od 10 do 79);
- na **breskvah, nektarinah, slivah in marelicah** za zatiranje **cvetnih monilij (*Monilinia spp.*)** v odmerku 0,5 kg/ha (5 g/100 m<sup>2</sup>) največ 2 krat v eni rastni dobi. Prvič tretirajte ob začetku cvetenja, ko je odprtih 10 % cvetov (BBCH 62). Drugič tretirajte, ko začnejo odpadati prvi venčni listi (BBCH 67) oziroma pred napovedanim dežjem;

- na **breskvah, nektarinah, slivah** in **marelicah** za zmanjševanje okužb s **sadnimi monilijami (*Monilinia spp.*)** v odmerku 0,6 kg/ha (6 g/100 m<sup>2</sup>) največ 2 krat v eni rastni dobi. Prvič tretirajte tri do štiri tedne pred obiranjem, drugič pa en teden pred obiranjem.

## OPOZORILA

Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov, kot sta npr. uporaba neustreznih odmerkov, prepogosta uporaba sredstev z enakim načinom delovanja. Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekajletni uporabi. Sredstvo **Chorus 50 WG** bo delovalo učinkovito, če bo uporabljeno v skladu z navodilom.

## VAROVANJE OKOLJA

Pri tretiranju morate preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varovanja vode. Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m torisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

## FITOTOKSIČNOST

Če sredstvo uporabljate v predpisanem odmerku in v skladu z navodili za uporabo, ni nevarnosti, da bi poškodovalo zgoraj navedene gojene rastline.

## MEŠANJE Z DRUGIMI SREDSTVI

**Chorus 50 WG** lahko mešate z drugimi sredstvi, ki imajo dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih gojenih rastlinah.

## PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE

Preverite, da je škropilnica čista, natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam ne bo ostajala. Napolnite rezervoar do polovice potrebne količine s čisto vodo, vključite mešalo in dodajte potrebno količino sredstva. Ob stalnem mešanju dolijte preostalo potrebno količino vode. Mešalo mora biti vključeno ves čas tretiranja. Po končanem delu škropilnico sperite s čisto vodo.

## KARENCA

- za jabolane, hruške in kutine 21 dni;
- za breskve, nektarine, marelice in slive 7 dni.

## ZAŠČITA UPORABNIKA

Med rokovanjem s sredstvom morate nositi ustrezno zaščitno opremo: delovno obleko, rokavice in čevlje.

## ZNAKI ZASTRUPITVE

Znaki zastrupitve pri ljudeh do sedaj niso znani. Lahko se pojavijo znaki preobčutljivostne reakcije.

## PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI

**Splošni ukrepi:** Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, jo zavarujte pred mrazom in vročino ter ji zagotovite osnovne življenjske funkcije. Pokličite zdravnika in mu pokažite originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

**V primeru stika s kožo:** Odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo dobro umijte z milom in vodo.

**V primeru stika z očmi:** S palcem in kazalcem razprite očesni vekli in oči temeljito sperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

**Pri vdihavanju:** Ravnajte v skladu s splošnimi ukrepi.

**Pri zaužitju:** Usta sperite z vodo. Bruhanja ne izzivajte. Oseba naj popije 2 dl vode. Pokličite zdravnika.

**Opozorilo:** Osebi z moteno zavestjo ne smete dati ničesar piti niti ne izzivati bruhanja.

## NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ

Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije.

**Specifičnega protistrupa ni, zdravljenje je simptomatično.**

## UKREPI V PRIMERU NENAMERNEGA IZPUSTA

**V zaprtem prostoru:** Če se poškoduje embalaža in se sredstvo raztrese, ga je treba ob uporabi osebnih zaščitnih sredstev (tudi maska s filtrom za prah) pobrati in spraviti v posebno, za to določeno in označeno posodo. Tla očistite z detergentom ali sodo in vodo. Pobrano sredstvo in odpadno vodo predajte v uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. V primeru požara gasite s prahtom, peno, ogljikovim dioksidom ali razpršeno vodo.

**Pri prevozu:** Ugasnite motor vozila in ne kadite. Zavarujte mesto nezgode in nanjo opozorite ostale udeležence v prometu ter o nezgodi obvestite Center za obveščanje na tel. št.: 112. Sicer pa ukrepajte, kot je navedeno zgoraj.

## POSTOPEK Z OSTANKOM SREDSTVA IN S PRAZNO EMBALAŽO

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, morate oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadke skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže.

Z neizpraznjeno in slabo oprano embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

## Navodilo za uporabo je v skladu z odločbo o registraciji.

Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Proizvajalec ne jamči za delovanje sredstva, če pri uporabi le-tega niso upoštevane vse navedene omejitve in opozorila. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja sredstva, proizvajalec ne odgovarja.